

Опасность бруцеллёза

Бруцеллез – инфекционная, преимущественно хронически протекающая болезнь животных и человека, сопровождающаяся лихорадкой, поражением сосудистой, нервной и других систем и особенно часто опорно-двигательного аппарата.

Источник возбудителя инфекции – больные бруцеллезом животные. Особенно опасны они в период выраженных симптомов болезни. Передача возбудителя осуществляется контактным (при контакте с больным животным, через предметы ухода, корма, подстилки, вода, почва, спецодежда) и алиментарным путями (инфицированные продукты).

К бруцеллезу восприимчивы крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи, олени, лошади, собаки, кошки, зайцы, лисицы, грызуны, дикие кабаны.

Передача инфекции осуществляется преимущественно чаще всего пищевым и водным путем.

Значительную эпидемиологическую опасность представляют собой молоко, полученное от больных животных и молочные продукты (брынза, кумыс, сыры), мясо, изделия из животного сырья (шерсть, кожа). Животные загрязняют испражнениями почву, воду, корм, что также может способствовать заражению человека непищевым путем: при уходе за животными и обработке животного сырья.

Симптомы бруцеллеза у человека:

Период развития заболевания 7 дней до 8 недель, чаще 2 недели.

Симптомы бруцеллеза у человека развиваются, обычно, постепенно.

Основные жалобы:

—Перемежающаяся болезненность в суставах, по большей части в нижних конечностях, время от времени очень мучительная и сильная.

—Увеличение температуры тела в виде длительного субфебрилитета (до 38 °С) или волнообразного типа с резкими подъёмами и падениями.

—Усиленная потливость, испарина, временами ночная потливость.

Рекомендации населению:

— приобретать продукты животноводства в санкционированных местах торговли(рынки,магазины,);

— не допускать употребление сырого молока и кисломолочной

продукции, приобретенных у частных лиц без термической обработки;
— при приготовлении мяса – готовить небольшими кусками, с проведением тщательной термической обработки.
Дополнительно, лицам, работа которых связана с риском заражения бруцеллезом:

— проходить профилактический медицинский осмотр;
— использовать средства индивидуальной защиты (халат и комбинезон, резиновые или кожаные сапоги, резиновые перчатки или брезентовые рукавицы, шапочки или косынки, нарукавники, клеенчатые фартуки).
Соблюдение указанных рекомендаций позволит предотвратить заражение бруцеллезом!

□